

PATIENT CARD

To be completed nationally {To be added here in the national labelling text: information on how the patient card will be provided to the patient e.g. as a separate card inside the package}

The patient card is provided to the patient as a separate card bundled with the package leaflet inside the package.

Patient card for Topamax – For women and girls who are able to become pregnant

Contraception and Pregnancy Prevention

What you must know

- Topamax is a medicine for epilepsy and migraine headaches.
- Topamax can seriously harm an unborn child if taken during pregnancy.

What you must do

- Read the package leaflet and Patient Guide carefully before use.
- Use highly effective contraception during your treatment with topiramate and for at least 4 weeks after the last topiramate dose. Your doctor will advise you on the most suitable method for you.
- Visit your doctor to review your treatment at least once a year.
- If you think you have become pregnant, talk to your doctor straight away.
- If you are thinking about having a child, do not stop using contraception before you have talked to your doctor.
- If you have epilepsy, do not stop using topiramate unless your doctor tells you to, as your condition may become worse.

Keep this card.

For full prescribing information, please refer to the data sheet or contact Johnson & Johnson Middle East FZ LLC, Mohamed Bin Rashid Academic Medical Centre – Building 14, Level 7
P.O. Box 505080, United Arab Emirates

Tel: +97144297200

Fax: +97144297150

Adverse events reporting guidance:

You can report any problem or adverse event to:

Emirates Drug Establishment

United Arab Emirates

Email: pv@ede.gov.ae

Tel: 80033784

Or to Johnson & Johnson:

Email: GCC-PV2@its.jnj.com

Hotline: +97155 981 6775

بطاقة المريض
سيتم إكمالها على المستوى الوطني (تتم إضافتها هنا في نص وضع العلامات الوطنية: معلومات حول كيفية تقديم بطاقة المريض للمريض، على سبيل المثال. كبطاقة منفصلة داخل العلبة)
سيحصل المريض على بطاقة المريض كبطاقة منفصلة مرفقة مع نشرة العبوة داخل العبوة.

بطاقة المريض الخاصة بدواء توباماكس – للنساء والفتيات القادرات على الحمل

منع الحمل

المعلومات التي يجب معرفتها

- توباماكس هو دواء لعلاج الصرع الصُّدَاغِ الشَّقِيّ.
- يمكن أن يسبب توباماكس ضرراً خطيراً للجنين إذا تم تناوله أثناء الحمل.

الإجراءات اللازمة

- يجب قراءة نشرة العبوة ودليل المريض بعناية قبل الاستعمال.
- يجب استخدام وسيلة فعالة للغاية لمنع الحمل في أثناء علاجك بالتوبراميت ولمدة 4 أسابيع على الأقل بعد تناول آخر جرعة من توبراميت. سوف ينصحك طبيبك بالوسيلة التي هي أنسب لك.
- يجب زيارة طبيبك لمراجعة علاجك مرة واحدة على الأقل في السنة.
- إذا كنت تعتقدين أنك أصبحت حاملاً، فتحدثي مع طبيبك على الفور.
- إذا كنت تفكرين في إنجاب طفل، فلا تتوقفي عن استخدام وسائل منع الحمل قبل التحدث مع طبيبك.
- إذا كنت تعانين من الصرع، فلا تتوقفي عن استخدام توبراميت إلا إذا أخبرك طبيبك بذلك، لأن حالتك قد تتفاقم.

يجب الاحتفاظ بهذه البطاقة.

للحصول على معلومات عن طريقة استخدام الدواء ، يرجى الرجوع الى النشرة الداخلية او التواصل مع جونسون أند جونسون ميدل ايست – دبي في مركز محمد بن راشد الأكاديمية الطبية، المبنى الرابع عشر، الطابق السابع، مدينة دبي الطبية ، الإمارات العربية المتحدة

ص.ب 505080

الهاتف: 0097144297200

فاكس: 0097144297150

للاطلاع عن الأعراض الجانبية و شكاوى عن المنتجات او اي استفسارات طبية، يرجى التواصل بنا عبر:

مؤسسة الإمارات للدواء

الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: pv@ede.gov.ae

الهاتف: 80033784

أو جونسون أند جونسون:

الايمل : GCC-PV2@its.jnj.com

الخط المباشر: 00971559816775